

子宮輸卵管攝影檢查

Q1：子宮輸卵管攝影檢查會有什麼不舒服？

A1：子宮輸卵管攝影檢查的不舒適感，因人而異有人只是輕微的酸麻感，有的人則會有劇烈的疼痛。在檢查的過程當中，心情盡量放輕鬆有助於減少不舒適感。

Q2：做完子宮輸卵管攝影檢查之後，回家要注意什麼？

A2：因為有器械於子宮做固定，回家後有少量的出血是正常的現象，如果出血量大於月經來潮時的出血量，或是一直都不止血就是不正常的現象，要請您回醫院，請婦產科醫師診視並處理。另外，請您回家要按時服用事先開好的抗生素，以避免骨盆腔感染的可能性。

Q3：什麼情況不適宜作子宮輸卵管攝影？

A3：這個檢查的適當時間，應該是月經後的四至七天，太早或是太晚做這個檢查都不適宜，會影響判讀的結果。懷孕、子宮外孕、骨盆腔發炎、月經剛結束或將來時、有對顯影劑過敏病史者。

Q4：什麼是子宮輸卵管攝影檢查？

A4：這個檢查是將水溶性顯影劑，經由陰道注入子宮及輸卵管，在 x 光射線下透視作檢查。可以用來檢查輸卵管是否有阻塞，子宮內部是否有沾黏或是腫瘤等等問題。

Q5：子宮輸卵管攝影檢查事前要怎麼準備？

A5：在您預約要做這個檢查的時候，門診醫師會開立檢查相關藥物，包括止痛藥，胃藥，以及抗生素。並請您檢查當天要帶衛生棉備用。

Q6：子宮輸卵管攝影檢查的時間需要多久？

A6：這個檢查分為兩個部分。第一次注射顯影劑的檢查約需時十分鐘左右，如果不能配合，檢查時間會再延長。第一次檢查結束之後要請您稍後三十分鐘，再做第二次的照相。所以整個流程約需時 40-50 分鐘。

Q7：可能的併發症為何？

A7：(A) 輕度併發症：因腹膜反應引起的下腹疼痛、嚴重出血，其他發生率較少的如：過敏反應、子宮內膜異位、膿性輸卵管破裂等。

(B) 重度病發症：骨盆腔感染(1~2%)

(C) 使用含碘對比劑之可能不良作用：

1. 少數人在注射含碘對比劑時會發生溫熱感覺、噁心、嘔吐、頭暈、打噴嚏，通常在短時間內會消退。
2. 具過敏性體質者，可能引起較嚴重的反應，如全身性蕁麻疹、寒顫、呼吸困難等症狀。
3. 具特異體質者，可能發生極罕見之喉頭水腫、氣喘、血壓降低、心肺衰竭、休克及猝死。
4. 所有不良反應的發生率約為 3.1%至 12.7%，而嚴重的全身性反應發生率約為 0.04%至 0.2%，死亡率約為十萬分之一。

