

四價 HPV 疫苗衛教單張

台灣婦產科醫學會、台灣兒科醫學會、台灣家庭醫學醫學會 編制

您在接種人類乳突病毒 (HPV; Human Papillomavirus) 疫苗之前，請詳閱本須知

四價 HPV 疫苗是什麼？有什麼作用？

四價 HPV 疫苗是一個注射針劑的疫苗，用以預防下列因感染人類乳突病毒所引起的疾病：

1. 子宮頸癌(發生在子宮下端的癌症)及子宮頸癌前期病變。
2. 外陰癌前期病變。
3. 陰道癌前期病變。
4. 生殖器疣(菜花)。

哪些人可以接種四價 HPV 疫苗？

1. 建議 12 歲至 26 歲的女性可以接種四價 HPV 疫苗。
2. 9 歲至 12 歲的兒童，請家長與醫師討論決定是否適合接種四價 HPV 疫苗。

哪些人不可以接種四價 HPV 疫苗？

1. 對四價 HPV 疫苗所含的任何一種成份有過敏紀錄，或曾經於接種一次四價 HPV 疫苗有過敏的人(產品仿單中載有疫苗成份)。
2. 已懷孕的女性，不建議接種四價 HPV 疫苗。

有關 HPV 疫苗有哪些重要須知？

1. HPV 第 16/18 型是最常見的高危險人類乳突病毒，子宮頸癌有超過 70%是由 HPV16/18 型所引起的，HPV6/11 是最常見的低危險人類乳突病毒，生殖器疣(菜花)有 90%是由 HPV 6/11 型所引起的。
2. 四價 HPV 疫苗乃用於預防而非治療。
3. 四價 HPV 疫苗的預期效應：降低 65%至 70%罹患子宮頸癌的風險；降低 50%子宮頸癌前病變；降低 90%生殖器疣；以及 97%人類乳突病毒 16/18 感染。
4. 接種四價 HPV 疫苗並不能取代常規的子宮頸癌篩檢，接種四價 HPV 疫苗的女性，仍須定期接受子宮頸抹片檢查。所有曾經有性行為的女性，必須依據子宮頸抹片臨床指引，定期接受子宮頸抹片檢查以及追蹤。如果女性一年內沒有接受過子宮頸抹片檢查，應建議做子宮頸抹片檢查。
5. 正在罹患子宮頸癌或癌前期的女性，不建議施打四價 HPV 疫苗。
6. 若您已經感染了某些型別的人類乳突病毒再接種四價 HPV 疫苗，無法預防您發生因這些已感染型別所引起的疾病。
7. 四價 HPV 疫苗的妊娠級數為 B 級。接種四價 HPV 疫苗期間如有懷孕，不需終止懷孕。哺餵母乳期間，可以接受四價 HPV 疫苗接種。

接種四價 HPV 疫苗之前您應告知醫師哪些事情？

您的醫師將決定您或您的孩子是否須接種四價 HPV 疫苗。

1. 曾對疫苗接種產生過敏現象。

2. 有出血性問題及不能的手臂上打針。
3. 正發燒至 37.8°C 以上的任何疾病。
4. 已懷孕或計畫即將懷孕。
5. 正在服用或即將服用的任何藥物，包括指示用藥及成藥。

如何接種四價 HPV 疫苗？

四價 HPV 疫苗是採用注射的方式施打。

1. 第一劑量：在一個您和您的醫師選定的日期。
2. 第二劑量：在首次劑量的 1 至 2 個月後。
3. 第三劑量：在首次劑量的 6 個月後。

HPV 疫苗可能造成的副作用有哪些？

1. 最常通報的副作用包括有：
 - (1) 注射部位痛、腫脹、癢及發紅。
 - (2) 發燒。
2. 曾有發生呼吸困難(支氣管痙攣)的案例經通報，但很少見。
3. 如果您或您的孩子在接種四價 HPV 疫苗之後有任何不尋常或嚴重的症狀發生，請立即與您的醫師聯絡。

HPV 疫苗接種異常反應報告：

於接種 HPV 疫苗其間有異常反應發生時或懷孕時，務必告知為您接種 HPV 疫苗的醫師與衛生署相關單位。

接種 HPV 疫苗的相關問題諮詢與反應窗口：

1. 衛生署藥物不良反應通報中心
 - (1) 聯絡地址：台北市中正區愛國東路 100 號
 - (2) 聯絡電話：(02) 2370-1704
 - (3) 網站地址：<http://www.adr.doh.gov.tw>
2. 台灣婦產科醫學會
 - (1) 聯絡地址：台北市民權西路 70 號 5 樓
 - (2) 聯絡電話：(02)2568- 4819
 - (3) 網站地址：<http://www.taog.org.tw>
3. 台灣兒科醫學會
 - (1) 聯絡地址：台北市杭州南路一段 69 號 10 樓之 1
 - (2) 聯絡電話：(02)2351- 6446
 - (3) 網站地址：<http://www.pediatr.org.tw>
4. 台灣家庭醫學醫學會
 - (1) 聯絡地址：台北市中正區懷寧街 92 號 4 樓
 - (2) 聯絡電話：(02) 2331- 0774
 - (3) 網站地址：<http://www.tafm.org.tw>